

盐酸西替利嗪片使用说明书

【药品名称】

通用名：盐酸西替利嗪片


商品名：达内®

英文名：Cetirizine Hydrochloride Tablets

汉语拼音：Yansuanxitiliqin Pian

本品主要成分为二盐酸西替利嗪，其化学名为(±)-2-[4-[(4-氯苯基)苯甲基]-1-哌嗪基]乙氧基乙酸二盐酸盐。

其结构式为：



【性状】本品为白色圆形片。

【药理毒理】西替利嗪是一种强效的 H_1 受体拮抗剂，口服进入体内，迅速与靶细胞膜上的组胺 H_1 受体结合，阻断组胺激活靶细胞。西替利嗪无明显的抗胆碱能和抗 5-羟色胺作用。在正常剂量下，不易透过血脑屏障。本品可抑制变态反应初期组胺传递，降低炎性细胞的游走活性和变态反应后期的递质释放，故对迟发期变态反应亦有效，本品是一种高选择性的 H_1 受体拮抗剂，至今未发现对心脏电生理产生不良影响。

动物急性毒性试验，小鼠口服的 LD_{50} 为 237mg/Kg，大鼠口服的 LD_{50} 为 562mg/Kg。

【药代动力学】口服 10mg 后，30~60 分钟达最高血药浓度。食物因素对吸收程度无影响，但可以轻微影响吸收速率。本品半衰期为 6.7~10.9 小时(儿童 6.9~7.1 小时)。西替利嗪的血浆蛋白结合率约为 93%，肝脏仅有少量代谢，首过效应很小，主要以原形通过肾脏消除。长期给药并不改变药物清除率。

【适应症】季节性过敏性鼻炎；常年性过敏性鼻炎；皮肤过敏；瘙痒；急慢性荨麻疹等。皮肤划痕症；湿疹；过敏性皮炎。药品、食品、化妆品所致急性过敏反应，昆虫叮咬等；眼部过敏；瘙痒、红肿、流泪等；支气管哮喘及其他变态反应性疾病。

【用法与用量】口服，每次一片(10mg)，每日一次，2-6 岁儿童半片(5mg)/日，或遵医嘱。

【不良反应】偶见轻微困倦，少数病人有胃肠道不适。

【禁忌症】对本品过敏者禁用。

【注意事项】避免饮酒；肾功能不良者剂量减半。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇及哺乳期妇女不推荐使用本品。

【儿童用药】2 岁以下儿童不推荐使用本品。

【老年患者用药】尚无文献资料明确报道。

【药物相互作用】应避免与镇静药合用。

【药物过量】服用过量(一次性口服超过 50mg)时,应进行胃肠灌洗和相应的支持治疗。

【规格】10mgx10 片/盒,10mgx6 片/盒。铝塑包装。

【有效期】二年

【贮藏】密闭,阴凉干燥处。

【批准文号】国药准字 H20010598

【生产企业】

企业名称:昆山龙灯瑞迪制药有限公司

地 址:江苏省昆山开发区黄浦江中路 258 号

邮政编码:215300

电话号码:0512-57702217

传真号码:0512-57711634

网 址:www.rotamreddy.com